

به نام خدا

۱. این دارو برای چه مصرف می شود؟
۲. قبل از گرفتن این دارو لازم است چه چیزهایی را به پزشک خود بگویید؟
۳. مطالبی که در دوران مصرف دارو باید بدانید.
۴. عوارضی که در صورت مشاهده باید به پزشک اطلاع دهید.
۵. عوارض دارویی کم خطری که ممکن است رخ دهد.
۶. بهترین روش مصرف دارو

(۱) این دارو برای چه مصرف می شود؟

این دارو یک داروی ضد ویروس است و برای درمان بیماری کرونای شما تجویز شده است. این دارو مدت زمان بیماری را کوتاه می کند، قدرت انتقال به سایر افراد و شدت بیماری را نیز کاهش می دهد.

(۲) قبل از گرفتن این دارو لازم است چه چیزهایی را به پزشک خود بگویید؟

- اگر به دارو یا غذایی آلرژی دارید به پزشک بگویید و درباره علائم آلرژی خود توضیح دهید.
- اگر مشکل کلیوی دارید.
- اگر مشکل کبدی دارید یا آنزیم های کبدی شما بالا است.
- اگر بیماری دیابت دارید.
- اگر در حال حاضر در حال مصرف کلروکین یا هیدروکسی کلروکین هستید.
- اگر از داروی ریفامپین، آمیودارو، وراپامیل و دیلتیازم استفاده می کنید.
- اگر هر بیماری دیگری دارید و از داروهای دیگری (که شامل داروهای گیاهی و ویتامین ها هم می شود) استفاده می کنید.
- اگر باردار هستید یا برنامه باردار شدن دارید.
- اگر شیرده هستید.

(۳) مطالبی که در دوران مصرف دارو باید بدانید

در دوران استفاده از این دارو و تا یک هفته پس از اتمام درمان از روش جلوگیری از بارداری موثر و مطمئنی استفاده کنید.

بهتر است در دوران درمان و تا یک هفته بعد از آن شیردهی انجام نشود اما در این مورد تصمیم قطعی با پزشک است.

از پزشک خود بخواهید قبل از شروع درمان با رمدسیویر و در حین دریافت این دارو آنزیم های کبدی شما را پایش نماید.

(۴) عوارضی که در صورت مشاهده باید به پزشک اطلاع دهید

نشانه هایی از آلرژی مانند کهیر، لکه های پوستی، خارش شدید، ورم پوستی، پوسته ریزی، خس کردن هنگام نفس کشیدن، احساس خفگی و تنگی نفس، مشکل در بلع غذا و یا در صحبت کردن، خشن شدن غیرمعمول صدا، ورم دهان، صورت، لب ها، زبان و گلو.

نشانه هایی از مشکل کبدی مانند تیره شدن رنگ ادرار، احساس خستگی شدید، عدم اشتها، درد معده، رنگ روشن مدفوع، استفراغ و زرد رنگ شدن پوست یا چشم.

نشانه های دیگری مانند افت فشار خون یا افزایش فشار خون، سردرد و سرگیجه و غش کردن.

۵) عوارض دارویی کم خطری که ممکن است رخ دهد

احساس ناراحتی معده

در صورت بروز تهوع، سردرد و هرگونه ناراحتی دیگری در حین دریافت دارو (این دارو در سرم حل شده و در مدت زمان ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت به شما تزریق می شود) به مراقب سلامت خود اطلاع دهید و در صورت امکان درخواست این را داشته باشید که سرعت تزریق را آهسته تر نمایند.

اگر عارضه ی دیگری با مصرف این دارو برای شما پیش آمد با اطلاع دادن این عارضه به داروسازان داروخانه دکتر سالم می توانید در بهبود روند درمان بیماران کمک کنید.

۶) بهترین روش مصرف دارو

روز اول :انفوزیون وریدی تک دوز بارگیری ۲۰۰ میلی گرم

روز دوم و روزهای بعد :انفوزیون وریدی ۱۰۰ میلی گرم

مدت زمان درمان ۵ روز است (کل دوره درمان) و در صورت صلاحدید و تجویز پزشک دوره درمان تا ۱۰ روز هم میتواند ادامه یابد.

رمدسیویر برای انفوزیون داخل وریدی پس از رقیق سازی به کار می رود.

از تزریق داخل عضلانی رمدسیویر خودداری کنید.

رمدسیویر به صورت پودر لیوفیلیزه سفید تا زرد کم‌رنگ است.
رقیق سازی محلول رمدسیویر باید کاملاً تحت شرایط آسپتیک (استریل) باشد.
محلول رقیق شده باید طی همان روز آماده سازی، مصرف شود.
رمدسیویر رقیق شده، باید پس از معاینه ی چشمی، شفاف و فاقد ذره باشد.

نحوه آماده سازی:

۱. برای هر یک عدد ویال حاوی پودر لئوفیلیزه، ابتدا ۱۹ میلی لیتر آب مقطر به ویال اضافه شود.
۲. بلافاصله باید برای ۳۰ ثانیه تکان داده شود. (به صورت رفت و برگشتی و از شدید تکان دادن ویال خود داری فرمایید).
۳. برای ۲-۳ دقیقه اجازه می‌دهیم تا محتویات ته‌نشین شود.
۴. باید یک محلول شفاف و بدون هیچ ذره‌ای حاصل شود.
۵. در صورتی که محتویات ویال به خوبی حل نشده باشد مجدداً ۳۰ ثانیه تکان می‌دهیم و ۲-۳ دقیقه فرصت استراحت داده می‌شود.

*این محلول آماده‌سازی شده را قبل از رقیق سازی و تجویز می‌توان حداکثر ۴ ساعت در دمای اتاق و ۲۴ ساعت در یخچال (۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد) نگه‌داری کرد.

سپس فوراً مراحل رقیق سازی را انجام دهید.

نحوه رقیق سازی:

۱. سرم سازگار با این دارو نرمال سالین ۰/۹٪ می باشد.

۲. هر ویال با ۲۵۰ میلی لیتر نرمال سالین باید رقیق شود و سپس برای مدت ۳۰-۱۲۰ دقیقه انفوزیون گردد.

۳. بعد از اتمام هر انفوزیون باید ۳۰ میلی لیتر نرمال سالین فلاش شود.

* هر چه مدت انفوزیون بیشتر باشد احتمال ایجاد واکنش های حساسیتی کمتر خواهد بود.

* حتما باید قبل از تجویز، ویال های آماده سازی شده با نرمال سالین رقیق شوند و سپس انفوزیون شوند.

۷) بهترین روش نگهداری از دارو

مراقبت های لازم جهت پیشگیری از آلودگی میکروبی این فرآورده را به کار گیرید.

ویال رمدسیویر فاقد ماده نگهدارنده یا باکتریواستاتیک است؛ به همین دلیل به محض رقیق سازی

باید انفوزیون وریدی این دارو صورت گیرد.

۸) در صورت فراموشی یک دوز دارو چه باید کرد؟

در صورت فراموش کردن یک دوز حتما با پزشک خود مطرح نمایید و از انجام تصمیمات خود سرانه
جدا خود داری فرمایید.

با آرزوی بهبودی برای شما هم وطن عزیز
داروخانه دکتر سالم